



## Urticária multiforme

Liliana Pinho<sup>1</sup>, Sara Oliveira<sup>2</sup>, Conceição Silva<sup>3</sup>

1. Serviço de Pediatria, Departamento da Criança e Adolescente, Centro Hospitalar do Porto
2. Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho
3. Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde

A urticária multiforme, também conhecida por urticária anular aguda, consiste numa reacção de hipersensibilidade cutânea caracterizada pelo aparecimento súbito de pápulas eritematosas policíclicas e anulares de centro claro, pruriginosas e fugazes, associadas a angioedema facial e/ou das extremidades e dermatografismo. Pode ser secundária a infecções, fármacos ou imunizações. Responde favoravelmente aos anti-histamínicos, podendo ser necessário, nos casos mais exuberantes, associar corticóides sistémicos, com regressão das lesões após dois a doze dias.

Apresentamos as imagens de um menino de 18 meses de idade, sem antecedentes patológicos relevantes, observado por exantema pruriginoso generalizado com 24 horas de evolução caracterizado por pápulas eritematosas e lesões com halo eritematoso e centro claro, fugazes e que desapareciam à digito-pressão (Figura 1), em contexto febril, associado a edema das mãos e pés (Figura 2) e dermatografismo (Figura 3). Colocado o diagnóstico de urticária multiforme secundária a provável infecção vírica. Resolução sintomática com anti-histamínicos e corticóide oral, após 2 dias.



**Recebido:** 16.10.2011  
**Aceite:** 19.01.2012

**Correspondência:**  
Liliana Pinho  
Serviço de Pediatria, Departamento da Criança e Adolescente,  
Hospital Maria Pia – Centro Hospitalar do Porto  
Rua da Boavista, 827  
4050-111 Porto  
liliana.pinho@gmail.com

A situação clínica descrita é muitas vezes erroneamente designada como eritema multiforme, entidade que, ao contrário, se caracteriza por verdadeiras lesões em alvo (com necrose central), fixas, sem angioedema nem dermatografismo associados.

A urticária multiforme parece estar subdiagnosticada, em parte devido à escassez de casos publicados.

**Palavras-chave:** urticária multiforme; criança

### Referências

1. Shah KN, Honig PJ, Yan AC. "Urticaria Multiforme": A case series and review of acute annular urticarial hypersensitivity syndromes in children. *Pediatrics* 2007; 119: e1177-83.
2. Guerrier G, Daronat JM, Deltour R. Unusual presentation of acute annular urticaria: A case report. *Case Rep Dermatol Med* 2011, 604390. doi:10.1155/2011/604390
3. Myers SR, Lavelle J. Mycoplasma pneumonia pneumonia with associated urticaria multiforme rash. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2009; 163: 1158.