

Quadro II. Caracterização dos doentes internados entre 1 de junho de 1996 e 31 de maio de 2013 por celulite orbitária: comparação entre as celulites orbitárias pré-septais e as pós-septais. *DP - desvio padrão; IC - intervalo de confiança.

Características	Todos (n=305)	Pré-septal (n=241)	Pós-septal (n=64)	p
Demográficas				
Idade média ($\pm DP^*$) (anos)	4,6 ($\pm 3,9$)	4,4 ($\pm 3,8$)	5,2 ($\pm 4,3$)	0,121
Masculino:Feminino	161:144	125:116	36:28	0,575
Caucasiana:Negra:Outra	170:83:29	137:63:20	33:20:9	0,306
Graffar I-III:IV-V	44:41	37:37	7:4	0,547
Casa:Infantário:Ama:Escola	25:56:11:48	18:40:9:34	7:16:2:14	0,904
Etiologia provável				
Porta de entrada	109 (35,7%)	98 (84,6%)	11 (17,2%)	0,000
Sinusite	166 (54,4%)	113 (46,9%)	53 (82,8%)	0,000
Sinais e sintomas				
Hiperémia ocular	250 (82,2%)	194 (80,8%)	56 (87,5%)	0,270
Lacrimejo	27 (15,9%)	18 (12,7%)	9 (32,1%)	0,020
Prurido ocular	21 (12,3%)	19 (12,7%)	2 (9,5%)	1,000
Exsudato ocular	90 (37,0%)	73 (37,4%)	17 (35,4%)	0,868
Fotofobia	6 (3,8%)	1 (1,5%)	5 (22,7%)	0,000
Alterações da visão	3 (1,7%)	2 (1,3%)	1 (3,4%)	0,413
Edema palpebral	293 (96,4%)	233 (97,1%)	60 (93,8%)	0,252
Febre	153 (50,7%)	114 (47,9%)	39 (60,9%)	0,069
Dor ocular	38 (19,7%)	18 (12,0%)	20 (46,5%)	0,000
Proptose	25 (13,2%)	12 (7,8%)	13 (36,1%)	0,000
Rinorreia	147 (59,8%)	114 (60,0%)	33 (58,9%)	0,878
Obstrução nasal	68 (33,7%)	46 (28,6%)	22 (53,7%)	0,003
Fácies adenoides	22 (14,7%)	18 (13,7%)	4 (21,1%)	0,484
Terapêutica prévia				
Sistémica	61 (20,1%)	49 (20,5%)	12 (18,5%)	0,684
Tópica	40 (13,2%)	31 (12,9%)	9 (13,8%)	
Ambas	16 (5,3%)	14 (5,9%)	2 (3,1%)	